

## 8.3 Landschapselementen op de stroomruggen



*Oeverbegroeiing langs de Vecht van riet en moeras.*



*Het slotenpatroon staat haaks op de stroomrug, iets verder van de stroomrug af ligt een hakhoutbosje.*

De meest typerende landschapselementen van de stroomruggen zijn de oeverbeplantingen van de Vecht, de landgoedbossen met stinzeplanten en de boomgaarden en bosjes. De buitens en landgoedbossen zijn beschreven in hoofdstuk 7.

### **Oevervegetaties Vecht**

De oevers van de Vecht vertonen een afwisseling van natuurlijke oevers met hoge natuurwaarden en beschoeiده oevers met lage natuurwaarden en in het algemeen ook een lagere beeldkwaliteit. Een natuurlijke begroeiing bestaat uit riet en moeras.



*Natuurvriendelijke oevers verhogen de ecologische waarde en tevens de capaciteit voor waterberging.*

### **Vochtig loofbos**


Van oorsprong komt buitendijks langs de Vecht vochtig loofbos voor; essen-iepenbos en elzen-essenbos. Deze soorten komen ook nu voor; es, wilg, els, vuilboom, vlier, lijsterbes, meidoorn en bitterling. Deze bitterling slaat op de bittere wilg. Ze werd vroeger gebruikt als oeverbeschoeiing langs de Vecht en is nu vaak doorgegroeid. Dit vraagt om een goed beheer.

### **Slotenpatronen**

Ook op de stroomruggen komen sloten voor. Zij vormen de grenzen van de verkaveling. Behoud van de sloten is gewenst evenals het behoud van natuurlijke of natuurvriendelijke oevers.

### Kavelgrensbeplanting

Kavelgrensbeplanting komt voor op de erven en soms langs kavelgrenzen. Zij bestaat op de stroomruggen bijvoorbeeld uit eik, populier, (knot)wilgen of een combinatie van meidoorn, es en els. Afhankelijk van de soort is de onderhoudscyclus voor wilg en populier 4 tot 6 jaar en voor els en es 10 tot 12 jaar.



Een houtsingel als kavelgrensbeplanting kent een hakhout-beheer, waarbij om de circa 7 jaar een deel van de beplanting wordt teruggesnoeid.

### Bosjes

Binnendijks op drogere gronden horen soorten als (winter)eik, lijsterbes, populier, ratelaar, beuk, kardinaalsmuts, sleedoorn, meidoorn, hazelaar en haagbeuk. Ook op de stroomrug kwamen op de erven geriefhoutbosjes voor.

### Solitaire bomen

Vaak komen voor op het erf enkele fraaie solitaire bomen voor. Soorten die hier voor komen zijn bijvoorbeeld vrij staande walnoot, kastanje, iep, rode beuk, plataan, pavia, moerascypres, treurbomen, (lei)linde en eventueel noorse esdoorn.

### Hagen

Het gebruik van boerenhagen wordt gestimuleerd. Dit zijn hagen bestaande uit een gemengde soorten. Wilde liguster geniet de voorkeur, echter hagen kunnen onder andere ook uit meidoorn of sleedoorn bestaan. In tuinen komt ook hulst voor en in buitens ook taxus, haagbeuk en beuk.

### Wegbeplantingen

Ook in de dwarslanen in de Vechtstreek Zuid komt de rijkere beplanting van deze stroomrug terug in soorten als eik en populier.



Meidoornstruwelen langs de Vecht.



Haaks op de stroomrug van de zuidelijke Vechtstreek zijn laanbeplantingen langs wegen te vinden, zoals hier een eikenlaan met hagen.